

# Survey sull'uso dei BIOMARCATORI negli ambulatori di asma grave

Analisi preliminari al 7 maggio 2018

**109**


Risposte totali

Data di creazione: venerdì 2 febbraio 2018

Risposte complete: 86

## Q1: Usi biomarcatori per la gestione dell'asma grave?


OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Si	87,85%	94
No	12,15%	13
TOTALE		107



Risposte: 107 Saltate: 2

## Q2: Li ritieni utili per la tua pratica clinica?


OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
SI	99,07%	106
No	0,93%	1
TOTALE		107



Risposte: 107 Saltate: 2

### Q3: In caso di risposta positiva, quali ritieni utili nella pratica clinica?


OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Eosinofilia ematica	97,78%	88
Eosinofilia dello sputo indotto	16,67%	15
Ossido nitrico esalato	72,22%	65
Dosaggio IgE totali	85,56%	77
Condensato esalato	3,33%	3
Totale rispondenti: 90		



Risposte: 90 Saltate: 19


## Q4: Con quale tempistica per l'eosinofilia ematica?

OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Mai	0,00%	0
Solo alla diagnosi	13,33%	12
Ogni 3 mesi	31,11%	28
Ogni 6 mesi	44,44%	40
Ogni 12 mesi	11,11%	10
<b>TOTALE</b>		<b>90</b>




## Q5: Con quale tempistica per l'eosinofilia su sputo indotto?

OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Mai	52,94%	45
Solo alla diagnosi	18,82%	16
Ogni 3 mesi	5,88%	5
Ogni 6 mesi	10,59%	9
Ogni 12 mesi	11,76%	10
<b>TOTALE</b>		<b>85</b>



## Q6: Con quale tempistica per l'ossido nitrico esalato?


OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Mai	15,91%	14
Solo alla diagnosi	10,23%	9
Ogni 3 mesi	36,36%	32
Ogni 6 mesi	23,86%	21
Ogni 12 mesi	13,64%	12
<b>TOTALE</b>		<b>88</b>



Risposte: 88 Saltate: 21

## Q7: Con quale tempistica per il dosaggio delle IgE?

OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Mai	3,37%	3
Solo alla diagnosi	44,94%	40
Ogni 3 mesi	10,11%	9
Ogni 6 mesi	12,36%	11
Ogni 12 mesi	29,21%	26
<b>TOTALE</b>		<b>89</b>






## Q8: Quali biomarcatori possono precisare un profilo idoneo per l'uso di omalizumab? *(risposte multiple)*

OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Allergia ad allergeni perenni	89,89%	80
Allergia ad allergeni stagionali	13,48%	12
IgE elevate	91,01%	81
IgE normali	8,99%	8
Eosinofili ematici < 300	7,87%	7
Eosinofili ematici > 300	11,24%	10
Eosinofili ematici > 400	2,25%	2
Eosinofili su sputo indotto > 3 %	3,37%	3
Eosinofili su sputo indotto < 3 %	2,25%	2
FENO > 50 ppb	29,21%	26
FENO < 50 ppb	0,00%	0
Totale rispondenti: 89		


Risposte: 89    Saltate: 20



## Q9: Quali biomarcatori possono precisare un profilo idoneo per l'uso di mepolizumab? (risposte multiple)


OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Allergia ad allergeni perenni	20,00%	18
Allergia ad allergeni stagionali	7,78%	7
IgE elevate	12,22%	11
IgE normali	11,11%	10
Eosinofili ematici < 300	11,11%	10
Eosinofili ematici > 300	83,33%	75
Eosinofili ematici > 400	17,78%	16
Eosinofili su sputo indotto > 3%	28,89%	26
Eosinofili su sputo indotto < 3%	1,11%	1
FENO > 50 ppb	36,67%	33
FENO < 50 ppb	1,11%	1
Totale rispondenti: 90		

Risposte: 90 Saltate: 19



## Q10: Quali biomarcatori possono precisare un profilo idoneo per l'uso di reslizumab? *(risposte multiple)*

OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Allergia ad allergeni perenni	20,99%	17
Allergia ad allergeni stagionali	11,11%	9
IgE elevate	14,81%	12
IgE normali	9,88%	8
Eosinofili ematici < 300	4,94%	4
Eosinofili ematici > 300	50,62%	41
Eosinofili ematici > 400	48,15%	39
Eosinofili su sputo indotto > 3%	19,75%	16
Eosinofili su sputo indotto < 3%	0,00%	0
FENO > 50 ppb	35,80%	29
FENO < 50 ppb	0,00%	0
Totale rispondenti: 81		




Risposte: 81    Saltate: 28

## Q11: Quali biomarcatori possono precisare un profilo idoneo per l'uso di benralizumab? *(risposte multiple)*


OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Allergia ad allergeni perenni	18,42%	14
Allergia ad allergeni stagionali	5,26%	4
IgE elevate	13,16%	10
IgE normali	9,21%	7
Eosinofili ematici < 300	10,53%	8
Eosinofili ematici > 300	57,89%	44
Eosinofili ematici > 400	36,84%	28
Eosinofili su sputo indotto > 3%	27,63%	21
Eosinofili su sputo indotto < 3%	1,32%	1
FENO > 50 ppb	35,53%	27
FENO < 50 ppb	0,00%	0
Totale rispondenti: 76		

Risposte: 76    Saltate: 33



## Q12: Quali biomarcatori possono precisare un profilo idoneo per l'uso di dupilumab? (risposte multiple)


OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Allergia ad allergeni perenni	28,13%	18
Allergia ad allergeni stagionali	12,50%	8
IgE elevate	20,31%	13
IgE normali	9,38%	6
Eosinofili ematici < 300	17,19%	11
Eosinofili ematici > 300	54,69%	35
Eosinofili ematici > 400	21,88%	14
Eosinofili su sputo indotto > 3%	17,19%	11
Eosinofili su sputo indotto < 3%	0,00%	0
FENO > 50 ppb	37,50%	24
FENO < 50 ppb	1,56%	1
Totale rispondenti: 64		



## Q13: Quali biomarcatori possono identificare il Paziente idoneo alla termoplastica? *(risposte multiple)*


OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Allergia ad allergeni perenni	37,88%	25
Allergia ad allergeni stagionali	15,15%	10
IgE elevate	21,21%	14
IgE normali	34,85%	23
Eosinofili ematici < 300	33,33%	22
Eosinofili ematici > 300	18,18%	12
Eosinofili ematici > 400	16,67%	11
Eosinofili su sputo indotto > 3%	21,21%	14
Eosinofili su sputo indotto < 3%	21,21%	14
FENO > 50 ppb	43,94%	29
FENO < 50 ppb	25,76%	17
Totale rispondenti: 66		

Risposte: 66    Saltate: 43




## Q14: In prospettiva ritieni che siano utili ulteriori biomarcatori da utilizzare nella pratica clinica?

OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
SI	90,70%	78
No	9,30%	8
TOTALE		86



## Q15: Quali?

OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Periostina sierica	78,95%	60
Galectina sierica	23,68%	18
IL5 sierica	75,00%	57
IL4 sierica	42,11%	32
IL13 sierica	47,37%	36
DPP4	18,42%	14
Totale rispondenti: 76		




Risposte: 76    Saltate: 33



## Q16: Il tuo ambulatorio è:


OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Allergologico	41,86%	36
Pneumologico	75,58%	65
Totale rispondenti: 86		



Risposte: 86    Saltate: 23

## Q17: Quanti pazienti gestisci affetti da asma grave?

N. Centri/Risposte	83
Totale pazienti	2931
Media	35,3



## Q18: Il tuo centro è autorizzato alla prescrizione di farmaci biologici per il trattamento dell'asma grave?

OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
SI	84,52%	71
No	15,48%	13
TOTALE		84

